

**Akutväskan är framtagen av Agria Djurförsäkring.
Väskan innehåller förbandsmaterial för första hjälpen
vid sår- och ledsador.**

(Please turn over for English.)

- Locket kan tas av, använd som underlag – lägg förbandsmaterialet ovanpå.
- Axelremmen kan användas som grimskaff.

Vid akut skada – gör så här:

- Var lugn.
- Se till att varken din häst eller någon annan kan skadas ytterligare.
- Flytta hästen till ett ställe där den kan tas om hand.
- Bedöm skadan – kraftigt blödande sår, skador som behöver sys, om risk för att en led eller senskida har skadats, frakturer, brännskador och skador i ögat kräver omedelbar behandling av veterinär. Viktiga tel nr hittar du i väskan.

BLÖDANDE SÅR


Om blodet sprutar stötvis – stryp blodtillförseln ovanför skadan.

1. Knyt en bit gasbinda eller livrem maximalt hårt ovanför skadan. OBS! Får sitta i maximalt 20 minuter, annars kan vävnad skadas allvarligt.
2. Lägg tryckförband enligt nedan.
3. Kontakta veterinär.


Vid Kraftig blödning – lägg ett tryckförband.

1. Lägg en bit vikt gasvävsklädd bomull mot såret.
2. Behövs extra tryck lägg en hel gasbinda ovanpå sårytan eller vik ihop ytterligare en bit gasvävsklädd bomull.
3. Dra åt för ett rejält tryck med Power Vet-Flex.
4. Kontrollera blodflödet efter cirka 10 minuter, om blod sipprar igenom lägg på ytterligare ett lager (låt det första sitta kvar). Bandaget får sitta på maximalt en timme! Bandaget kan annars ge skador.
5. Kontakta veterinär.

Så här bremstar du en häst



Det här är två olika sätt att ta pulsen på hästen



ÖVRIGA SÅRSKADOR

Sårskador

1. Innan du börjar – tvätta dina händer med en våtservett.
2. Rengör såret. Använd flaskan med steril koksaltlösning och det sterila sprutmunstycket. Tryck hål på membranet upptill på flaskan med sprutmunstycket och skruva fast. Spruta försiktigt rent, med lagom tryck, utan att skada vävnaden ytterligare. Snåla inte med vätskan!
3. Fanns vattenslang med kallvatten kan du använda det.
4. Inspektera såret. Använd eventuellt pincett för att avlägsna skräp. Undvik att peta i såret med fingrarna.
5. Lägg en steril kompress närmast såret.
6. Klipp av en bit gasvävsklädd bomull och lägg runt.
7. Linda Power Vet-Flex runt bandaget. Dra inte åt för hårt.

Hudfläkning

1. Innan du börjar – tvätta dina händer med en våtservett.
2. Rengör såryta och hudflikar med steril koksaltlösning enligt punkt 2 ovan.
3. Lägg samman ytorna i sitt rätta läge, i möjligaste mån.
4. Vid större skador, kontakta veterinär.
5. Se till att ytorna hålls fuktiga till veterinären anländer.

Sår i ögat

1. Avlägsna eventuella föremål.
2. Spola ögat försiktigt enligt Sårskador punkt 2.
3. Kontakta veterinär. Skador på hornhinnan och ögat måste ses över genast, annars kan hästen förlora synen.


Spiktramp

1. Undersök var, i vilken riktning och hur långt föremålet har trängt in.
2. Om föremålet trängt in i strålens mellersta del kan böjsena och bursa ha skadats. Då ska veterinär tillkallas.
3. Rengör såret (hållet) genom att spruta/skölja med steril koksaltlösning enligt Sårskador punkt 2 ovan.
4. Bandagera med steril kompress eller Steri protect-kompress mot såret. Klipp av en bit gasvävsklädd bomull och placera under hoven.
5. Linda med Power Vet-Flex och avsluta med silvertejp.

SENSKADOR

1. Om möjligt, kyl benet, exempelvis med rinnande kallt vatten från en vattenslang.
2. Bandagera benet. Lägg ett lager gasvävsklädd bomull framknä till kota resp hasled till kota.
3. Linda med Power Vet-Flex. Dra inte åt för hårt.


Så här lägger du ett stallbandage



FRAKTURER, ben

1. Se till att hästen håller sig stilla.
2. Kontakta veterinär.

Så här lägger du ett hovbandage, t ex vid spiktramp eller hovböld



Så här lägger du ett galoppbandage, t ex vid balltramp

